



Legende:

- | | | | | | |
|--------|--|---|--------|--|---|
| 01.110 | | Buchenwälder mittlerer und basenreicher Standorte | 06.120 | | Grünland frischer Standorte, intensiv genutzt |
| 01.120 | | Bodensaure Buchenwälder | 06.210 | | Grünland feuchter bis nasser Standorte |
| 01.173 | | Bachauenwälder | 06.300 | | Übrige Grünlandbestände |
| 01.183 | | Übrige stark forstlich geprägte Laubwälder | 06.520 | | Magerrasen basenreicher Standorte |
| 01.220 | | Sonstige Nadelwälder | 09.200 | | Ausdauernde Ruderalfluren frischer bis feuchter Standorte |
| 01.300 | | Mischwälder | 11.110 | | Äcker basenreicher Standorte |
| 01.400 | | Schlagfluren und Vorwald | 14.100 | | Siedlungsfläche |
| 02.100 | | Gehölze trockener bis frischer Standorte | 14.460 | | Kleingebäude (landwirtschaftlich genutzt, mit Umgebung) |
| 02.300 | | Gebietsfremde Gehölze | 14.520 | | Befestigter Weg |
| 05.110 | | Röhrichte (inklusive Schilfröhrichte) | 14.530 | | Unbefestigter Weg |
| 05.130 | | Feuchtbrachen und Hochstaudenfluren | 14.580 | | Lagerplatz |
| 05.220 | | Kleinseggensümpfe basenreicher Standorte | 99.090 | | Frisch entbuschte Fläche |
| 06.110 | | Grünland frischer Standorte, extensiv genutzt | | | Einzelbäume |
| | | | | | Positiver negativer neutraler Einfluss der Kontaktbiotope |

Bearbeitung: Karl Peter Buttler

Datum: 29.11.2006

| | |
|--|-----------------------|
| Grunddatenerfassung FFH-Gebiet 5723-303 Weinberg von Neuengronau | |
| Biotoptypen , inklusive Kontaktbiotope (flächendeckend, analog Hessischer Biotopkartierung) | Karte 2 |