



Biotoptypen n. Hess. Biotopkartierung

- Buchenwald (01.120)
- Bachauenwald (01.173)
- Nadelwald (01.220)
- Mischwald (01.300)
- Vorwald (01.400)
- Waldrand (01.500)
- Gehölz trockener bis frischer Standorte (02.100)
- Gehölz feuchter Standorte (02.200)
- Gebietsfremdes Gehölz (02.300)
- Streuobst(03.000)
- Helokrenen und Quellfluren (04.113)
- Kleiner bis mittlerer Mittelgebirgsbach (04.211)
- Temporäre Gewässer und Tümpel (04.440)
- Feuchtbrache und Hochstaudenflur (05.130)
- Großseggenried (05.140)
- Grünland frischer Standorte, extensiv (06.110)
- Grünland frischer Standorte, intensiv (06.120)
- Grünland feuchter bis nasser Standorte (06.210)
- Grünland wechselfeuchter Standorte (06.220)
- Degradiertes Grünland (06.300)
- Adlerfarn- Staudenhalde (06.301)
- Borstgrasrasen (06.540)
- Ausdauernde Ruderalfluren frischer bis feuchter Standorte (09.200)
- Ackerfläche (11.140)
- Besiedelter Bereich, Verkehrsflächen (14.000)

Kontaktbiotope mit Biotop-Code (s. o.)

- Negativer Einfluss
- Positiver Einfluss
- Einfluss neutral

Regierungspräsidium Darmstadt -
Obere Naturschutzbehörde

Grunddatenerhebung
FFH- Gebiet 5815-305
"Trockenborn/Kellersbachtal bei Rambach"

Karte 1: Biotoptypen

Maßstab 1 : 5 000

Januar 2002



Kartengrundlage: Flurkarten 1 : 5 000



Planungsgruppe für Natur
und Landschaft

Raiffeisenstraße 5
35410 Hungen
Tel. 06402-5080270
Fax. 06402-5080290