

Legende:

FFH-Art des Anhangs II

 *Glaucopsyche nautithous* (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling)

Bestandsdichte des Wiesenknopfs (zusätzliche Signatur):

 niedrig (< 20 Pflanzen/qm)

 hoch (> 20 Pflanzen/qm)

Eignung der aktuellen Pflege:

 optimal (frühe oder späte einschürige Mahd oder frühe Erst- und späte Zweitmahd)

 suboptimal (Mahd kurz vor oder kurz nach der Hauptfortpflanzungszeit von *Glaucopsyche nautithous*)

 pessimal (Mahd während der Hauptfortpflanzungszeit von *Glaucopsyche nautithous*)

Die kritische Fortpflanzungszeit umfasst Flug- und frühe Raupenentwicklungsphase.

Bemerkenswerte Arten

• Pflanzenvorkommen

• Tiervorkommen

Gefäßpflanzen

- Bc *Bromus commutatus* (Wiesen-Trespe)
- Br *Bromus racemosus* (Traubige Trespe)
- Ca *Carex hartmanii* (Hartmans Segge) (im Mittelteil nicht kartiert)
- Dm *Dactylorhiza majalis* (Breitblättriges Knabenkraut) (im Mittelteil nicht kartiert)
- Ds *Dianthus superbus* (Pracht-Neike)
- Fv *Filipendula vulgaris* (Knollige Spierstaude) (im Mittelteil nicht kartiert)
- Gb *Galium boreale* (Nordisches Labkraut) (im Mittelteil nicht kartiert)
- Sr *Salix repens* (Kriech-Weide) (im Mittelteil teilweise kartiert)
- Sp *Stellaria palustris* (Sumpf-Sternmiere)
- Tf *Thalictrum flavum* (Gelbe Wiesenraute)
- Tm *Thalictrum minus* (Kleine Wiesenraute)
- Vp *Valeriana pratensis* (Wiesen-Baldrian)

Vögel

- Lc *Lanius collurio* (Neuntöter)

Reptilien

- La *Lacerta agilis* (Zauneidechse)

Heuschrecken


- Mm *Myrmeleotettix maculatus* (Gefleckte Keulenschrecke)
- Oc *Oedipoda caeruleascens* (Blaufügelige Ödlandschrecke)

Libellen

- Cm *Coenagrion mercuriale* (Heim-Azurjungfer)

Tagfalter

- Ch *Colias hyale* (Goldene Acht)
- Ls *Leptidea sinapis* (Tintenleck-Weißling)
- Pa *Polyommatus agestis* (Sonnenröschen-Bläuling)



FFH-Grunddatenerfassung 2004

Bearbeitung: Karl Peter Buttler, Kurt Möbus

FFH-Gebiet 6017-305 Kammereckswiesen und Kirchnerseckgraben von Langen

Verbreitung von Anhangs-Arten
und bemerkenswerten Arten

Karte

2