

Legende:

Biotoptypen nach HB (1995):



- Gehölze trockener bis frischer Standorte (02.100)
- Gehölze feuchter bis nasser Standorte (02.200)
- Gebietsfremde Gehölze (02.300)
- Streuobst (03.000)
- Grünland frischer Standorte, extensiv genutzt (06.110)
- Grünland frischer Standorte, intensiv genutzt (06.120)
- Übrige Grünlandbestände (06.300)
- Magerrasen basenreicher Standorte (06.520)
- frisch entbuschte Fläche (99.090)
- Ausdauernde Ruderalfluren frischer bis feuchter Standorte (09.200)
- Felsfluren (10.100)
- Therophytenfluren (10.300)
- Intensiväcker (11.140)
- Freizeitanlage, Rasenfläche (14.300)
- Einzelgebäude (Hundesport) (14.400)
- Feldscheune (14.440)
- Befestigter Weg (14.520)
- Unbefestigter Weg (14.530)
- Deponie (14.700)

Einfluss der Kontaktbiotope

- positiv
- neutral
- negativ

Grenze des FFH-Gebietes

Maßstab: 1:5.000



Kartengrundlage: Color-Infrarot-Orthophotos mit Erlaubnis des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie, Wiesbaden, und Amtliche Liegenschaftskarte mit Genehmigung der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG)



**FFH-Grunddatenerhebung
4622-301
Keischel bei Weimar**

Karte 2: Biotoptypen und Kontaktbiotope

Auftraggeber:
 Regierungspräsidium Kassel

Auftragnehmer:
 Hozak & Meyer landschaftsökologie + planung

bearb.: Hozak 08/2006

gez.: Hozak 10/2006

geänd.: Hozak 04/2007

Vor den Mäusen 1 · D-34395 Bad Karlshafen · Tel. Fax 056/2/2083 · e-mail: hozak-meyer@t-online.de