




0 25 50 75 100 Meter



### Biotoptypen und Kontaktbiotope

-  Grünland frischer Standorte, extensiv genutzt (Bestände mittlerer Artenvielfalt)
-  Grünland frischer Standorte, intensiv genutzt (artenarme Bestände)
-  Grünland feuchter bis nasser Standorte
-  Übrige Grünlandbestände (Grünlandbrachen)
-  Großseggenriede
-  Feuchtbrachen und Hochstaudenfluren
-  Röhrichte
-  Ausdauernde Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte
-  Gehölze trockener bis frischer Standorte
-  Gehölze feuchter bis nasser Standorte
-  Übrige stark forstlich geprägte Laubwälder
-  Graben
-  Teich
-  Intensivacker
-  Befestigter Weg
-  Unbefestigter Weg
-  Freizeitanlage

### Einfluß der Kontaktbiotope

-  positiver Einfluß
-  negativer Einfluß
-  neutraler Einfluß
-  Graben
-  Grenze des FFH-Gebietes

### Projekt

Grunddatenerhebung FFH-Gebiet 5025-302 Säulingssee bei Kleineseer

### Karte

Biotoptypen, inkl. Kontaktbiotope

### Maßstab

1:2500

### Gemeinde

Heringen

### Landkreis

Hersfeld-Rotenburg

Karte Nr.	Blatt Nr.	Bearbeitet	Tech. Bearb.	Geprüft	Datum
3		NEC	NEC	ACH	01.12.03

Neckermann & Achterholt  
Ökologische Gutachten  
35091 Cölbe Tel.: 06421/86491

Kartengrundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) der Hessischen Verwaltung für Regionalentwicklung, Kataster und Flurneuordnung